



サイチの納舎は頭痛のタネ

① 2017年に盛岡からやって来た「サイチ」は、夕方部屋に入ってきません。

② 無理に追いかけると柵にぶつかったりしてケガをさせる可能性も。

③ サイチの行動のひとつ先を読み行動範囲をせまくしていく。

④ サイチがあきらめて入るのを待つ。何頭も帰ってこない場合は数人の飼育員でおいこみ——!

※ 飼育員は観察力のほかに忍耐力も必要なんです!!

夏のあつい日は大変の汗。

IKKO 風



アカカンガルーのとくちょう

あぢー!



ドロ
ドロ

^{がんせん}
汗腺が発達していないため
暑い時は前足をなめて
体温調節します

太いしっぽは
5番目の足とされています

ゆっくり歩く時は前足と
尾を地面につけて
うしろ足をそろえて
歩きます



ズズズ...

はねて移動する時は
しっぽで地面をたたくように
うしろ足のみではねます



Bang

親父の
リラックス
ポーズ



なにか
ご意見でも?

有袋類の不思議 **カンガルー** 繁殖編

Point 1 **カンガルー** は一年じゅう繁殖できます。

Point 2 ♀の**カンガルー**には**赤ちゃん**が育つ**胎盤**がなく子宮も小さいため

赤ちゃんは未熟児で産まれます。 ←これくらい
体重約1g

Point 3 妊娠期間1ヶ月をすぎると頃
総排泄口から袋にむかって移動します。



袋までの毛をなめて道をつくります。



← Point 4 袋に入った**赤ちゃん**は
4つの乳首のうちの一つに吸いつきミルクを飲みます。

Point 5 約6ヶ月後 **赤ちゃん**は
袋から顔を出します。(出た日がたんじょう日)

Point 6 ♀の**カンガルー**はこどもが袋から出ると
すぐ妊娠します。(着床遅延)

